

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls2083/2006

Příbalová informace -VP

INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ !

Mobilat gel

Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo

Výrobce

STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo

Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Německo

Složení

Léčivé látky: Glycosaminoglycani polysulfas 0,2 g, Acidum salicylicum 2,0 g

Extractum suprarenale 1,0 g ve 100 g gelu

Pomocné látky: isopropylalkohol, olamin, kyselina polyakrylová, propylenglykol, rozmarýnová silice, dihydrát dinatrium-edetátu , čištěná voda

Indikační skupina

Analgetikum a protizánětlivá látka ke kožnímu podání.

Charakteristika

Mobilat, gel obsahuje kombinaci léčivých látek, které odlišnými způsoby urychlují procesy hojení. Mobilat, gel je velmi dobře snášen a bezprostředně po podání má příjemně chladivý účinek. Léčivé látky jsou rychle a úplně vstřebávány kůží a působí přímo na postiženou oblast bez ovlivnění trávicího ústrojí. Mobilat, gel zmenšuje bolest, potlačuje zánět a otok a podporuje vstřebávání krevních výronů. Mobilat, gel zvyšuje prokrvení, zlepšuje látkovou výměnu a podporuje hojení tkáně, což vede k rychlému ústupu bolesti a k návratu hybnosti. Přípravek zmenšuje pohybovou bolest a otoky při zánětech kloubů, svalů, šlach a měkkých tkání v okolí kloubů.

Indikace

Přípravek Mobilat, gel se používá u dospělých pacientů jako pomocná léčba u porážových stavů jako jsou např. namožení a natažení svalů a šlach, podvrtnutí kloubů a krevní výrony.

Pouze na doporučení lékaře je možné přípravek Mobilat užívat při léčbě zánětlivých kloubních onemocnění a zánětlivých postižení měkkých tkání.

Kontraindikace

Mobilat, gel se nesmí používat při přecitlivělosti na léčivé nebo pomocné látky tohoto přípravku. Nesmí se nanášet na porušenou kůži, do očí a na sliznice.

Pouze na výslovné doporučení lékaře používají přípravek těhotné a kojící ženy. Kojící ženy si nesmí nanášet Mobilat, gel na kůži v oblasti prsou.

Vzhledem v nedostatku zkušeností není přípravek Mobilat doporučen u dětí, dospívajících a pacientů s poškozenými ledvinami.

Nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale ojediněle se může objevit podráždění pokožky. Jestliže Mobilat, gel kůže dráždí, léčbu přerušete. Při výskytu uvedených nežádoucích účinků nebo dalších neobvyklých reakcí je nutné přerušit léčbu a poradit se s lékařem.

Interakce

Kyselina salicylová může zvýšit vstřebávání jiných současně používaných přípravků k zevnímu použití. Bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné krémy, masti nebo spreje.

Dávkování a způsob použití

Pokud lékař neurčí jinak, nanášejte na postižené místo 2 až 3krát denně potřebné množství gelu (5-15 cm dlouhý proužek) a lehce rozetřete. Ošetřené místo se nezakrývá obvazem.

Mobilat, gel je také na doporučení lékaře určen pro kombinaci s fyzikální léčbou.

Před prvním použitím je třeba propíchnout hliníkovou folii na otvoru tuby hrotem, který je na vrchní straně uzávěru.

Upozornění

Jestliže se do 5-ti dnů od zahájení léčby gelem Mobilat příznaky nezlepší nebo se dokonce zhorší, či se projeví nežádoucí účinky přípravku, vyhledejte lékaře! Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů.

Používáte-li Mobilat, gel, oznamte to při předepisování dalších léků lékaři. O vhodnosti užívání jiných volně prodejných léků současně s přípravkem Mobilat, gel se poradte s lékařem.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.

Uchování

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců

Varování

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti označené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

30, 50 a 100 g gelu.

Datum poslední revize: 2.3.2011