

Příbalová informace Vp

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Panadol Rapide

Potahované tablety

(Paracetamolum)

Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie

Výrobce: GlaxoSmithKline (Dungarvan) Ltd., Knockbrack, Dungarvan, Irsko

Složení

Léčivá látka: Paracetamolum 500 mg v 1 tabletě.

Pomocné látky: Kukuřičný škrob, povidon 25, kalium-sorbát, předbobtnalý škrob, hydrogenuhličitan sodný, mikrokrytalická celulóza, magensium-stearát, karnaubský vosk, potahová soustava opadry bílá II Y-22-7719 bílá.

Indikační skupina: analgetikum, antipyretikum

Charakteristika: Panadol Rapide obsahuje paracetamol, léčivou látku tlumící bolest a horečku. Složení tablet umožňuje, že paracetamol přechází do krevního oběhu nejméně dvakrát rychleji než ze standardní tablety s obsahem paracetamolu, a tak začíná i účinkovat rychleji.

Indikace: Panadol Rapide je určen k léčbě bolestí hlavy včetně migrény, bolestí zad, zubů a bolestí při menstruaci. Panadol Rapide je též určen k léčbě bolesti svalů, kloubů a bolestí v krku provázejících chřipku a nachlazení a snižuje horečku.

Po poradě s lékařem se přípravek může užívat k potlačení bolesti u některých revmatických onemocnění např. artróze (degenerativní kloubní onemocnění) nebo u neuralgií (bolest v průběhu nervu).

Panadol Rapide je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let.

Kontraindikace: Neužívejte Panadol Rapide, pokud jste přecitlivělí na paracetamol nebo jinou složku přípravku, při těžkém onemocnění jater včetně akutní žloutenky a při těžké hemolytické anemii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek).

Pacienti léčící se pro onemocnění jater, ledvin nebo pacienti s deficitem enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy se o vhodnosti užívání přípravku musí předem poradit s lékařem.

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu nebo užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.

Vzhledem k obsahu léčivé látky není přípravek určen dětem do 12 let.

Nežádoucí účinky: Podobně jako všechny léky, může mít i Panadol Rapide nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek používaný v doporučených dávkách je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout kožní vyrážky, nucení na zvracení, vzácně zúžení průdušek, poruchy jaterních funkcí a krvetvorby. Při případném výskytu neobvyklé reakce (např. kožní vyrážka) přestaňte přípravek užívat a poraďte se o dalším užívání s lékařem.

Interakce: Závažné lékové interakce jsou u paracetamolu výjimečné. Metoklopramid nebo domperidon může zvýšit rychlost vstřebávání paracetamolu, cholestyramin ji může snížit. Při pravidelném dlouhodobém užívání paracetamolu může být zvýšen účinek léků snižujících srážlivost krve (warfarin nebo jiné kumarinové přípravky) s následným zvýšením rizika krvácivých projevů. Občasné užívání nemá významný vliv. Současné užívání Panadolu Rapide s některými léky na spaní, proti epilepsii, některých antibiotik nebo pití alkoholu může vést v některých případech k poškození funkce jater. Současné dlouhodobé užívání Panadolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků může vést k poškození ledvin.

Dávkování a způsob užití: Dospělí včetně starších osob a mladiství od 15 let:

1 - 2 tablety až 4krát denně dle potřeby v časovém odstupu nejméně 4 hodiny. 1 tableta je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg. Nejvyšší jednotlivá dávka je 2 tablety. Neužívejte více než 8 tablet během 24 hodin. Tuto dávku neužívejte déle než 5 dní. Při dlouhodobém užívání by dávka za 24 hodin neměla překročit 2,5 g paracetamolu (tj 5 tablet Panadolu Rapide).

Mladiství 12-15let: 1 tableta v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin. Nepodávejte více než 6 tablet během 24 hodin.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Jestliže horečka neklesne do 3 dnů a bolest se nezmírní do 5 dnů nebo se naopak obtíže zhorší, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Lékaře vyhledejte, jestliže užíváte paracetamol pravidelně déle než 7 dní.

Upozornění: Dříve než začnete užívat Panadol Rapide, poraďte se v následujících případech s lékařem:

- Trpíte onemocněním jater nebo ledvin (lékař vám upraví dávkování)
- Užíváte léky obsahující metoklopramid, domperidon (k léčbě nevolnosti a zvracení) nebo cholestyramin (k léčbě vysoké hladiny cholesterolu v krvi).

- Užíváte léky pro snížení srážlivosti krve a potřebujete užívat léky proti bolesti denně po dlouhou dobu. Občasné užívání paracetamolu je možné.
- V těhotenství a při kojení.
- Každá tableta obsahuje 173 mg sodíku. V případě, že držíte dietu s nízkým obsahem sodíku, přípravek neužívejte.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu nebo trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte ihned lékaře, i když nepozorujete žádné příznaky a cítíte se dobře. Předávkování paracetamolem může způsobit závažné poškození jater.

Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Varování: Nepoužívejte po ukončení doby použitelnosti uvedné na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 24 potahovaných tablet

Datum poslední revize:
8.6.2011