

Příbalová informace – text na obal pro tradiční rostlinný přípravek

SPECIES UROLOGICAE PLANTA
Léčivý čaj

Choroby močových cest

Držitel registračního rozhodnutí a výrobce:

LEROS s.r.o.
U Národní galerie 470
156 15 Praha 5 - Zbraslav
Česká republika

Perorální podání.

a) 20 nálevových sáčků po 1,5 g
Hmotnost náplně 30,0 g

b) Hmotnost náplně 100,0 g

Indikační skupina

Fytofarmakum - urologikum, dezinficiens, antiflogistikum, diuretikum

Složení

a) nálevový sáček

Betulae folium 0,413 g (březový list), Uvae ursi folium 0,337 g (medvědicový list), Polygoni avic. herba 0,165 g (nat' rdesna ptačího), Ononis radix 0,150 g (kořen jehlice trnité), Petroselini radix 0,150 g (petrželový kořen), Urticae herba 0,150 g (kopřivová nat'), Millefolii herba 0,105 g (řebříčková nat'), Sambuci nigrae flos 0,030 g (květ bezu černého) v 1 nálevovém sáčku.

b) rezaná čajová směs

Betulae folium 27,5 g (březový list), Uvae ursi folium 22,5 g (medvědicový list), Polygoni avic. herba 11,0 g (truskavcová nat'), Ononis radix 10,0 g (kořen jehlice trnité), Petroselini radix 10,0 g (petrželový kořen), Urticae herba 10,0 g (kopřivová nat'), Millefolii herba 7,0 g (řebříčková nat'), Sambuci nigrae flos 2,0 g (květ bezu černého) ve 100 g čajové směsi.

Indikace

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako doplňková léčba při akutních infekčních chorobách močových cest, které se projevují pálením při močení a častým močením. Působí močopudně, antisepticky (protibakteriálně), uvolňuje křeče hladkého svalstva.

Desinfekční účinek medvědice lékařské (*Uvae ursi folium*) je vhodně doplněn dalšími léčivými rostlinami, které zvyšují tento účinek a působí příznivě při onemocněních močových cest.

Přípravek mohou užívat mladiství od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Dávkování a způsob podání

a) nálevové sáčky

1 nálevový sáček se přelije šálkem (1/4 l) vařící vody a po 10 minutách vyluhování v přikryté nádobě se vyjme. Ke zvýšení účinku se doporučuje přidat k nálevu na špičku nože užívací sodu. Čaj se pije teplý 3-5x denně. Připravuje se vždy čerstvý.

b) řezaná čajová směs

1 polévková lžíce (5 g) se přelije šálkem (1/4 l) vařící vody, po 15 minutách vyluhování se scedí. Pro zvýšení účinku se doporučuje přidat po vyluhování na špičku nože užívací sodu. Čaj se pije teplý 3-5x denně. Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Přípravek se obvykle používá 1-2 týdny, pokud lékař neurčí jinak.

Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, vyhledejte lékaře.

Léčbu je možno opakovat nejvýše 5 krát za rok.

Kontraindikace

Neužívejte při otocích způsobených nedostatečnou funkcí srdce a ledvin, při přecitlivělosti na některou složku přípravku. Přípravek nesmí užívat těhotné a kojící ženy.

Nepodávejte dětem do 12 let.

Nežádoucí účinky

U citlivých osob může vyvolávat žaludeční obtíže (nevolnost, zvracení), které po vysazení přípravku vymizí. Dále se mohou vyskytnout alergické kožní reakce.

Upozornění

Neužívejte s léky a potravou snižující pH moči (zvyšující kyselost moči) např. kyselé šťávy. Může způsobovat hnědé zbarvení moči.

Ošetřujícího lékaře informujte, že užíváte Species urologicae planta.

Pokud se u Vás během užívání přípravku objeví krev nebo hnus v moči, bolest v podbřišku nebo horečka, poradte se s lékařem.

Pokud příznaky onemocnění při používání tohoto tradičního rostlinného přípravku přetravají nebo pokud se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.

Varování

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poradte s lékařem.

Reg.č. 94/625/69 - C

Datum výroby (č.s.):

Použitelné do:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Sp. urologicae

Datum poslední revize textu: 14.12.2011.