

Příbalová informace - VP

HEPARIN AL GEL 30 000
(Heparinum natricum)
gel

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Heparin AL gel musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 týdnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Heparin AL gel a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Heparin AL gel používat
3. Jak se Heparin AL gel používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Heparin AL gel uchovávat
6. Další informace

1. Co je Heparin AL gel a k čemu se používá

Přípravek Heparin AL gel patří do skupiny léků nazývaných dermatologika, venofarmaka. Obsahuje léčivou látku heparin.

Při místním použití má heparin v oblasti podání mírné protisrážlivé a protizánětlivé účinky, působí proti otokům a usnadňuje vstřebání zánětlivé tekutiny.

Heparin AL gel se používá jako podpůrná léčba při otocích po tupých zraněních a nárazech, při zhmožděninách a výronech krve, při zánětech povrchových žil, pokud se nedají ošetřovat stahujícími obvazy, při zánětlivém prosáknutí tkáně (např. při bodnutí hmyzem).

Při povrchových zánětech jako je bodnutí hmyzem nebo oslunění je možno užít heparinový gel bez lékařské rady, pokud se stav nezlepší do tří dnů, je třeba vyhledat lékaře.

Heparin AL gel lze použít u dospělých, mladistvých a dětí všech věkových skupin. Přípravek smí použít i těhotné ženy a kojící matky.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete lék Heparin AL gel používat

Nepoužívejte Heparin AL gel pokud

- trpíte přecitlivělostí na heparin, kyselinu sorbovou a jakoukoliv složku obsaženou v přípravku Heparin AL gel

Přípravek se nesmí nanášet na sliznice, do očí, na otevřené rány, mokvající kožní ekzémy, na zanícená místa na kůži.

Zvláštní opatření při použití přípravku Heparin AL gel je zapotřebí

Není-li předepsáno jinak používejte Heparin AL gel přibližně 1-2 týdny. O delší době používání rozhodne lékař.

Při zánětech žil se gel nesmí vmasírovat, jenom se nanese na kůži v silné vrstvě. Dá se pak přiložit elastické obinadlo.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Účinky léku Heparin AL gel a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Předchozí nebo střídavé používání mastí s obsahem kyseliny salicylové může vést ke vzniku místního tečkovitého krvácení do kůže.

Těhotenství a kojení:

Přípravek smí použít i těhotné ženy a kojící matky.

Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek Heparin AL gel nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se Heparin AL gel používá

Pokud lékař neurčil jinak, nanáší se Heparin AL gel dvakrát až třikrát denně v tenké vrstvě, rovnoměrně na postiženou oblast kůže.

Lék se nesmí používat bez doporučení lékaře déle než 2 týdny.

Nezvyšujte doporučenou dávku! Neprodlužujte léčbu bez konzultace s lékařem!

Pokud máte další otázky k používání tohoto přípravku, zeptejte se lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Heparin AL gel nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, pouze v ojedinělých případech se může vyskytnout přecitlivělost, projevující se svěděním nebo zčervenáním kůže, po vysazení přípravku obvykle rychle vymizí.

Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

5. Jak přípravek Heparin AL gel uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Po použití tubu s gelem vždy dobře uzavřete.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Heparin AL gel obsahuje

Léčivá látka:

100 g gelu obsahuje 0,2 g sodné soli heparinu (heparinum natricum), odpovídá 30 000 mezinárodních jednotek.

Pomocné látky:

Kyselina polyakrylová, nekystalizující sorbitol 70%, polysorbát 80, dihydrát dinatrium-edetátu, trolamin, ethoxylované monodiacylglyceroly nasycených kyselin C8 – C10, kosodřevinová silice, borovicová silice, levomentol, isopropylalkohol, čištěná voda

Jak přípravek Heparin AL gel vypadá a co obsahuje toto balení

Heparin AL gel je průhledný homogenní gel s malou příměsí vzduchových bublinek, s charakteristickým zápachem po isopropylalkoholu.

Velikost balení:

Tuba se 40 g nebo 100 g gelu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Aliud Pharma GmbH and Co.KG

Gottlieb-Daimler-Strasse 19

D-89150 Laichingen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 11.1.2012.