

## PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

### NÁZEV PŘÍPRAVKU

**Žlučnicková čajová směs**

Léčivý čaj

K perorálnímu podání

### SLOŽENÍ

Menthae piperitae herba (nať máty peprné) 525 mg, Agrimoniae herba (řepíková nať 375 mg, Marrubii herba (jablečnicková nať) 375 mg, Rhei radix (reveňový kořen) 225 mg v 1 nálevovém sáčku.

### POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek podporující vylučování žluči při přechodném nechutenství a mírných trávicích obtížích, provázených nadýmáním, pocitem plnosti a napětím v břiše. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 12 let.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

### PŘÍPRAVA

1 nálevový sáček se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 5 - 10 min vyluhovat v zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý, neslazený 3x denně po jídle. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se do 1 týdne od zahájení léčby příznaky nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem.

### KONTRAINDIKACE

Neužívejte přípravek, pokud trpíte neprůchodností střev, zánětlivými chorobami střev (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), bolestmi břicha neznámého původu, nebo při závažných stavech dehydratace a poruše elektrolytové rovnováhy, Neužívejte při přecitlivělosti na některou složku přípravku nebo na mentol.

### NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Může se zhoršit gastroezofageální reflux a mohou zesílit obtíže s pálením žáhy. Mohou se objevit bolest a křeče v břiše, zejména u pacientů s dráždivým střevem. Může dojít ke žlutavému nebo červenohnědému zbarvení moči.

### UPOZORNĚNÍ

Přípravek byste neměl(a) užívat, pokud trpíte gastroezofageálním refluxem (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, projevující se pálením žáhy), neboť Vaše potíže mohou zesílit.

Při žlučových kamenech a jiných onemocněních žlučových cest konzultujte nejprve používání přípravku s lékařem.

Pacienti užívající srdeční glykosidy, antiarytmika, diuretika, adrenokortikosteroidy nebo kořen lékořice by se měli před použitím tohoto přípravku poradit s lékařem.

Přípravek se nedoporučuje užívat v době těhotenství a kojení.

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky, nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.  
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## **UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25° C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

## **VELIKOST BALENÍ**

30 g,	20 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem i bez přebalu
22,5 g,	15 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem
15 g,	10 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem
<b>PN 70 - 02</b>	nálevové sáčky bez přebalu
<b>PN 215 - 02</b>	nálevové sáčky s přebalem
<b>PN 343 - 07</b>	nálevové sáčky s přebalem
<b>PN 352 - 07</b>	nálevové sáčky s přebalem

## **REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

94/856/97-C

## **EAN KÓD**

8 594 0030 72 062	(nálevový sáček bez přebalu)
8 595 1519 45 482	(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)
8 595 1519 45 666	(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)
8 595 1519 45 840	(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

## **ČÍSLO ŠARŽE**

## **POUŽITELNÉ DO**

## **DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE**

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

## **INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

ŽLUČNÍKOVÁ ČAJOVÁ SMĚS

## **DATUM REVIZE TEXTU**

6.2.2012