

## PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

### NÁZEV PŘÍPRAVKU

**Čaj ze šalvěje**

Salviae herba

Léčivý čaj

K perorálnímu podání

### SLOŽENÍ

Salviae herba 1,5 g v 1 nálevovém sáčku

### POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek.

Užívaný *vnitřně*: při mírných trávicích potížích, pálení žáhy a nadýmání; omezuje nadměrné pocení

*Zevně*: při zánětech ústní dutiny, ke kloktání a k desinfekci dutiny ústní.

Přípravek je určen pro dospělé.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

### PŘÍPRAVA

*vnitřně: při zažívacích obtížích*: 1 nálevový sáček se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 15 min vyluhovat v zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3 x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

*k omezení nadměrného pocení*: 2 nálevové sáčky se přelijí 0,25 l vroucí vody a nechají se 15 min vyluhovat v zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

*zevně*: 2 nálevové sáčky se přelijí 0,25 l vroucí vody a nechají se 15 min vyluhovat v zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Nálev se používá několikrát denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

*Pro použití jako kloktadlo se pro přípravu nálevu použijí 2 sáčky na 120 ml vroucí vody.*

Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, poraďte se s lékařem.

### KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku.

### NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při přecitlivělosti ojedinělá možnost vzniku alergických reakcí.

Přípravek může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Při ovlivnění pozornosti neříďte ani neobsluhujte stroje.

## UPOZORNĚNÍ

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje a je třeba poradit se s lékařem.

Neužívejte současně s léky ovlivňujícími tzv. GABA receptory (např. barbituráty nebo benzodiazepiny, užívané k léčbě úzkosti nebo nespavosti). O souběžném užívání jiných léčivých přípravků se poraďte s lékařem.

V těhotenství a při kojení se vzhledem k nedostatku dat nedoporučuje přípravek užívat.

Nepoužívejte dlouhodobě.

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí

## VELIKOST BALENÍ

30 g, 20 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem i bez přebalu

22,5 g, 15 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

15 g, 10 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

**PN 110 - 02** nálevové sáčky bez přebalu

**PN 217 - 02** nálevové sáčky s přebalem

**PN 356 - 07** nálevové sáčky s přebalem

**PN 371 - 07** nálevové sáčky s přebalem

## REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/765/99-C

## EAN KÓD

8 594 0030 73 137 (nálevový sáček bez přebalu)

8 595 1519 43 020 (nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

8 595 1519 45 925 (nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

8 595 1519 46 229 (nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

## ČÍSLO ŠARŽE

## POUŽITELNÉ DO

## DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

**UVEDENÍ NÁZVU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA OBALU BRAILLOVÝM PÍSMEM**  
**ČAJ ZE ŠALVĚJE**

**DATUM REVIZE TEXTU**

4.4.2012