

Příbalová informace - VP

HEPARIN AL MAST 30 000  
(Heparinum natricum)  
mast

**Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.**

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Heparin AL mast musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 týdnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

**V příbalové informaci naleznete:**

1. Co je Heparin AL mast a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Heparin AL mast používat
3. Jak se Heparin AL mast používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Heparin AL mast uchovávat
6. Další informace

**1. Co je Heparin AL mast a k čemu se používá**

Přípravek Heparin AL mast patří do skupiny léků nazývaných dermatologika, venofarmaka. Obsahuje léčivou látku heparin.

Při místním použití má heparin v oblasti podání mírné protisrážlivé a protizánětlivé účinky, působí proti otokům a usnadňuje vstřebání zánětlivé tekutiny.

Heparin AL mast se používá jako podpůrná léčba při otocích po tupých zraněních a nárazech, při zhmožděninách a výronech krve, při zánětech povrchových žil, pokud se nedají ošetřovat stahujícími obvazy, při zánětlivém prosáknutí tkáně (např. při bodnutí hmyzem).

Při povrchových zánětech jako je bodnutí hmyzem nebo oslunění je možno užít heparinovou mast bez lékařské rady, pokud se stav nezlepší do tří dnů, je třeba vyhledat lékaře.

Heparin AL mast lze použít u dospělých, mladistvých a dětí všech věkových skupin. Přípravek smí použít i těhotné ženy a kojící matky.

**2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete lék Heparin AL mast používat**

Nepoužívejte Heparin AL mast pokud

- trpíte přecitlivělostí na heparin, kyselinu sorbovou a jakoukoliv složku obsaženou v přípravku Heparin AL mast

Přípravek se nesmí nanášet na sliznice, do očí, na otevřené rány a mokvající kožní ekzémy.

Zvláštní opatření při použití přípravku Heparin AL mast je zapotřebí

Není-li předepsáno jinak používejte Heparin AL mast přibližně 1-2 týdny. O delší době používání rozhodne lékař.

Při zánětech žil se mast nesmí vmasírovat, jenom se nanese na kůži v silné vrstvě. Dá se pak přiložit elastické obinadlo.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Účinky léku Heparin AL mast a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Předchozí nebo střídavé používání mastí s obsahem kyseliny salicylové může vést ke vzniku místního tečkovitého krvácení do kůže.

Těhotenství a kojení:

Přípravek smí použít i těhotné ženy a kojící matky.

Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek Heparin AL mast nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

### **3. Jak se Heparin AL mast používá**

Pokud lékař neurčil jinak, nanáší se Heparin AL mast dvakrát až třikrát denně v tenké vrstvě, rovnoměrně na postiženou oblast kůže.

Lék se nesmí používat bez doporučení lékaře déle než 2 týdny.

Nezvyšujte doporučenou dávku! Neprodłużujte léčbu bez konzultace s lékařem!

Pokud máte další otázky k používání tohoto přípravku, zeptejte se lékárníka.

### **4. Možné nežádoucí účinky**

Podobně jako všechny léky, může mít i Heparin AL mast nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, pouze v ojedinělých případech se může vyskytnout přecitlivělost, projevující se svěděním nebo zčervenáním kůže, po vysazení přípravku obvykle rychle vymizí.

Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

### **5. Jak přípravek Heparin AL mast uchovávat**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.  
Doba použitelnosti po prvním otevření je 12 měsíců.

Po použití tubu s mastí vždy dobře uzavřete.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

## **6. Další informace**

### Co přípravek Heparin AL mast obsahuje

Léčivá látka:

100 g masti obsahuje 0,2 g sodné soli heparinu (heparinum natricum), což odpovídá 30 000 mezinárodních jednotek.

Pomocné látky:

Střední nasycené triacylglyceroly, cetylstearylalkohol, oleyl-oleát, kyselina sorbová, kalium-sorbát, levomenthol, propylenglykol, kyselina citronová, esence dragoco, dihydrát dinatrium-edetátu, tokoferol alfa, askorbyl- palmitát, podzemnicový olej, čištěná voda .

### Jak přípravek Heparin AL mast vypadá a co obsahuje toto balení

Heparin AL mast je opalescentní, homogenní, snadno roztíratelná, bílá mast.

Velikost balení:

Tuba se 40 g nebo 100 g masti.

### Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Aliud Pharma GmbH

Gottlieb-Daimler-Strasse 19

D-89150 Laichingen, Německo

**Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 13.6.2012**