

Text příbalové informace na obalu

Var.A) **REDUKTAN v nálevových sáčcích**
Čajová směs při redukční dietě

Var.B) **REDUKTAN**
Čajová směs při redukční dietě

Léčivý čaj k vnitřnímu užití

Výrobce a držitel registračního rozhodnutí:

LEROS, s. r.o.

U Národní galerie 470

156 15 Praha 5 - Zbraslav

Česká republika

Var.A) 20 nálevových sáčků po 2,0 g

hmotnost 40 g

Var.B) hmotnost 100,0 g

Složení

Var.A)

Fucus vesiculosus (chaluha bublinatá) 0,30g, Frangulae cortex (krušínová kůra) 0,30g, Sambuci flos (květ černého bezu) 0,30g, Sennae folium (sennový list) 0,20g, Foeniculi amari fructus (fenyklový plod) 0,20g, Petroselinii radix (petrželový kořen) 0,20g, Sambuci fructus (plod černého bezu) 0,20g, Betulae folium (list břízy) 0,20g, Liquiritiae radix (lékořicový kořen) 0,10g v 1 nálevovém sáčku.

Var.B)

Fucus vesiculosus (chaluha bublinatá) 15,0g, Frangulae cortex (krušínová kůra) 15,0g, Sambuci flos (květ černého bezu) 15,0g, Sennae folium (sennový list) 10,0g, Foeniculi amari fructus (fenyklový plod) 10,0g, Petroselinii radix (petrželový kořen) 10,0g, Sambuci fructus (plod černého bezu) 10,0g, Betulae folium (list břízy) 10,0g, Liquiritiae radix (lékořicový kořen) 5,0 g ve 100 g čajové směsi.

Charakteristika

Směs léčivých drog ovlivňujících metabolismus, s účinkem projímavým (Frangulae cortex, Sennae folium, Fucus vesiculosus, Sambuci fructus) a mírně močopudným (Betulae folium, Petroselinii radix).

Příprava a dávkování

Var.A)

1 nálevový sáček se přelije 1/4 l vařící vody a po 5 minutách vyluhování v přikryté nádobě se vyjme. Čaj se nesmí vařit.

Var.B)

1 polévková lžice (5 g) čajové směsi se přelije šálkem (1/4 l) vařící vody a po čtvrt hodině vyluhování v přikryté nádobě se scedí, čaj se nesmí vařit.

Pije se teplý, neslazený 1 - 3x denně před jídlem nejlépe na noc.

Při průjemových obtížích se pití čaje omezí na 1x denně, nejlépe večer.

Po 14 ti dnech se pití čaje na dalších 14 dnů přeruší, aby se předešlo možnému návyku a nežádoucím účinkům.

Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Použití

Při redukční dietě, obezitě (zejména komplikované zácpou), ovlivňuje metabolismus, působí mírně projímavě a močopudně.

Kontraindikace

Nepoužívá se v těhotenství, v období kojení a u osob s onemocněním srdce a ledvin doprovázeným otoky.

Nežádoucí účinky

Při dodržení doporučeného způsobu užívání nejsou obvyklé.

Při případném výskytu neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem

Upozornění

Při předávkování a nedodržení doporučeného způsobu užívání může dojít k narušení rovnováhy elektrolytů a ztrátě draslíku. Užívání přípravku zastavte a vyhledejte lékaře.

Datum výroby (č.šarže):

Použitelné do :

Reg.č.: 94/144/72-C

Uchovávejte v suchu při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

reduktan

Datum poslední revize textu: 21.11.2012