

Příbalová informace - VP
Informace pro použití, čtěte pozorně!

TUSSIN
Perorální kapky, roztok.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Teva Czech Industries s.r.o., Opava-Komárov, Česká republika

Složení:

Léčivé látky

Butamirati dihydrogenocitras 46,2 mg v 10 ml.
(1 ml = 34 kapek).

Pomocné látky

Ethanol 96%, propylenglykol, polysorbát 80, aroma alpských květin, tekutý lékořičový extrakt, čištěná voda.

Indikační skupina:

Antitusikum.

Charakteristika:

Přípravek tlumí dráždění ke kašli. Na rozdíl od přípravků, obsahujících kodein, nepůsobí útlum dechového centra a nevyvolává návyk při dlouhodobém užívání.

Indikace:

Přípravek mohou používat dospělí, děti i mladiství. Přípravek se používá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest, při zánětech horních cest dýchacích, při zánětu hltanu, hrtanu, průdušek a průdušnice, kde je možné ho po omezenou dobu užívat bez porady s lékařem.

Na doporučení lékaře lze použít i u astmatu, při astmatickém zánětu průdušek, kašli při tuberkulóze, zaprášení a zánětu plic.

Tussin lze podat i k utišení kašle před a po operaci.

Kontraindikace:

Neužívat při známé přecitlivělosti na léčivé látky nebo kteroukoli pomocnou látku.

Přípravek se nesmí podávat dětem do 2 měsíců věku.

V těhotenství a v období kojení je možné přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Nežádoucí účinky:

Nežádoucí účinky přípravku nejsou známy.

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte se svým lékařem.

Interakce:

Interakce nejsou dosud známy.

Dávkování:

Pokud lékař neurčí jinak, dává se podle hmotnosti pacienta:

hmotnost	počet dávek na den	počet kapek v jedné dávce
do 7 kg	3-4	7
8-12 kg	3-4	8
13-20 kg	3-4	10
21-30 kg	3-4	12
31-40 kg	3-4	14
41-50 kg	3	20
51-70 kg	3	30
nad 70 kg	3	35

Pokud si zapomenete vzít svou dávku ve stanovenou dobu, užijte ji, jakmile si vzpomenete, a dále pak pokračujte při užívání přípravku ve svých pravidelných časových intervalech, avšak nikdy neužívejte dvě dávky současně.

Způsob podání:

Dávka se odkape z lahvičky ve svislé poloze, dnem vzhůru, a to do vody, čaje nebo ovocné šťávy. Minimální příjem tekutiny by měl být při každém podání kapek asi 100 ml. Užívá se po jídle.

Upozornění:

Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků choroby do 3 dnů nebo se stav zhorší, popř. dojde-li k výskytu neobvyklých reakcí, vyhledejte lékaře.

O vhodnosti současného užívání Tussinu s jinými léky se poraďte s lékařem.

Bude-li Vám lékař předepisovat jiné léky, oznamte mu, že užíváte Tussin.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Přípravek obsahuje 28% ethanolu.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření: maximálně 12 měsíců.

Varování:

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:

10 ml a 25 ml

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

Datum revize textu:

19.12.2012