

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MAALOX suspenze

perorální suspenze
aluminii hydroxidum, magnesii hydroxidum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek MAALOX suspenze musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 10 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek MAALOX suspenze a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MAALOX suspenze užívat
3. Jak se přípravek MAALOX suspenze užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek MAALOX suspenze uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK MAALOX SUSPENZE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek MAALOX suspenze působí proti nadměrné kyselosti žaludeční šťávy (antacidum). Léčivé látky obsažené v přípravku mají silný neutralizační účinek na kyselinu chlorovodíkovou, která se vyskytuje v žaludku a je zodpovědná za kyselost žaludečního obsahu, a tím kyselost tohoto obsahu snižuje.

Přípravek MAALOX suspenze se užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny, jako je pálení žáhy, zatékání kyselého žaludečního obsahu do úst. Na doporučení lékaře se přípravek užívá k léčbě zánětů žaludeční sliznice, zánětů sliznice jícnu a může být součástí léčby žaludečního a dvanácterníkového vředu. Přípravek mohou užívat dospělí i dospívající od 15 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MAALOX SUSPENZE UŽÍVAT

Neužívejte přípravek MAALOX suspenze

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli složku přípravku MAALOX suspenze
- jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin

Zvláštní opatření při použití přípravku MAALOX suspenze je zapotřebí

- jestliže trpíte poruchami vyprazdňování střev (průjemy, zácpa, zúžení tlustého střeva)
- v případě úbytku hmotnosti

- při potížích s polykáním a při přetrvávajících zažívacích potížích, které se objevily poprvé nebo se nedávno změnilly
- při onemocnění ledvin (přípravek obsahuje hořčík a hliník, což může způsobit potíže při dlouhodobém užívání u nemocných se selháním ledvin)

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.

U pacientů s dietou zaměřenou na nízký obsah fosforu může užívání hydroxidu hlinitého obsaženého v přípravku MAALOX suspenze zapříčinit deficit fosforu.

Užívání hydroxidu hlinitého se nedoporučuje u pacientů s porfyrií.

Pacienti s poruchou krevních hladin fosforu a hořčíku mohou přípravek užívat pouze na výslovné doporučení lékaře.

Bez přímého doporučení lékaře nesmí být přípravek podáván dětem a dospívajícím mladším než 15 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku MAALOX suspenze jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Přípravek může snižovat vstřebávání velké většiny současně užívaných léků (např. antibiotika, přípravky s obsahem železa, fosforu, fluoridu, indomethacin, chlorochin, digoxin, fexofenadin, glukokortikosteroidy, fluorochinolony, kayexalat, ketokonazol, lanzoprazol, fenothiazinová neuroleptika, penicilamin, tyroxin, cimetidin, ranitidin, atenolol, metoprolol, propanolol, diflunisal, cykliny, isoniazid, ethambutol, salicyláty). Je proto vhodné dodržovat mezi užíváním přípravku MAALOX suspenze a dalších léků časový odstup nejméně 2 hodiny.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, neužívejte přípravek, pokud Vám to nedoporučí lékař. V kojení se může během léčby pokračovat.

Důležité informace o některých složkách přípravku MAALOX suspenze

MAALOX suspenze obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK MAALOX SUSPENZE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek MAALOX suspenze přesně v souladu s příbalovou informací, nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají dospělí a dospívající od 15 let obvykle jeden sáček přibližně jeden a půl hodiny po jídle, nebo při bolesti v žaludeční krajině.

Maximálně je možné užívat 6 sáčků denně (pokud lékař výslovně nedoporučí jiné dávkování).

Dávkování u zánětlivých nebo vředových onemocnění trávicího traktu vždy určí lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MAALOX suspenze, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MAALOX suspenze nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout poruchy vyprazdňování, jako je zácpa nebo průjemy. Při překročení doporučeného dávkování se mohou tyto obtíže stupňovat. Ve vzácných případech se mohou vyskytnout příznaky přecitlivělosti ve formě kožní vyrážky. Při dlouhodobém užívání nebo užívání vysokých dávek může dojít ke snížení vstřebávání fosfátů ze zažívacího traktu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK MAALOX SUSPENZE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25⁰ C, chraňte před mrazem.

Přípravek MAALOX suspenze nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek MAALOX suspenze, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek MAALOX suspenze obsahuje

- Léčivými látkami jsou magnesií hydroxidum 600 mg (ve formě vodní suspenze), aluminii hydroxidum 525 mg (ve formě vodní suspenze) v jednom sáčku (15 ml suspenze).
- Pomocnými látkami jsou kyselina chlorovodíková 35%, monohydrát kyseliny citronové, silice máty peprné, mannitol, methylparaben, propylparaben, sodná sůl sacharinu, nekrytalizující sorbitol 70%, čištěná voda.

Jak přípravek MAALOX suspenze vypadá a co obsahuje toto balení

Lehce viskózní mléčná suspenze sladké chuti po mátě.

Velikost balení 30 sáčků.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce přípravku:

Sanofi – Aventis S.p.A., Viale Europa, Origgio, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

20.2.2013