

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls29165/2013

Příbalová informace - VP
Informace pro použití, čtěte pozorně!

VENORUTON
gel

Držitel rozhodnutí o registraci:

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Novartis s.r.o., Ohradní 61, 140 00 Praha 4, Česká republika
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Složení:

Léčivá látka: oxerutinum 2 g ve 100 g gelu.
Pomocné látky: roztok hydroxidu sodného, dihydrát edetanu disodného, benzalkonium- chlorid, karbomer 980, čištěná voda.

Indikační skupina:

Venofarmakum.

Charakteristika:

Venoruton gel má více složek, jeho účinná složka působí na stěnu nejmenších cév, zvětšuje její odolnost a normalizuje její propustnost. Má rovněž protizánětlivý účinek a tudíž široké možnosti k místní léčbě otoku a dalších příbuzných příznaků majících původ v chronické žilní nedostatečnosti nebo v úrazu.

Jde o gel na vodném základě bez alkoholu, nemastný a bez zápachu. Je velmi dobře snášen a po nanesení na kůži rychle proniká pokožkou. Jeho komponenty jsou zjistitelné za 30 minut v kůži a za 2 až 5 hodin v podkožní tukové tkáni.

Indikace:

Venoruton gel je vhodný k léčbě při pocitu těžkých a bolestivých nohou, u otoků kotníků a bérců při chronické žilní nedostatečnosti vzniklé u křečových žil nebo po žilních zánětech. Přípravek se užívá po ošetření křečových žil sklerotizací (opichem), u bolestí a otoků pouřazového původu, podvrtnutí a vymknutí, svalového zhmoždění. Venoruton gel je vhodný pro léčbu dospělých a dětí od 6 let věku. Dospělý pacient může léčbu zahájit sám. Použití Venorutonu gelu u dětí zváží lékař.

Venoruton gel může být používán od 4. měsíce těhotenství i v období kojení.

Kontraindikace:

Neužívejte Venoruton gel při přecitlivělosti na některou složku přípravku.
Neužívejte Venoruton gel v prvních třech měsících těhotenství.

Nežádoucí účinky:

Venoruton gel je dobře snášen. Ojedinele se u přecitlivělých pacientů mohou objevit kožní reakce podobné kopřivce a jiné neobvyklé reakce. V těchto případech je třeba přerušit léčbu a poradit se se svým lékařem. Tyto příznaky však zpravidla spontánně vymizí záhy po přerušení užívání.

Interakce:

Účinky Venorotonu gelu a jiných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Užíváte-li jiné léky na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti současného užívání Venorotonu gelu se svým lékařem. Při předpisu jiných léků oznamte svému lékaři, že užíváte Venoruton gel. O vhodnosti současného užívání jiných volně prodejných léků se poraďte s lékařem.

Dávkování a způsob použití:

Pokud nedoporučí Váš lékař jinak naneste ráno a večer gel na léčené oblasti a jemně masírujte, dokud gel není vstřebán a pokožka není suchá. U dětí by plocha léčené oblasti neměla přesáhnout velikost dvou dlaní léčeného dítěte. Přípravek by měl být užíván podle doporučení Vašeho lékaře po dobu trvání obtíží.

Upozornění:

Jestliže nedojde k ústupu obtíží po 3 týdnech léčby je nutné, aby pacient vyhledal lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Při požití Venorotonu gelu dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.

Varování:

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti označené na obalu jako "Použ. do". Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Balení:

Tuba se 40 nebo 100 g 2% gelu.

Datum poslední revize:

21.2.2013