

## **PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE**

### **CLARITINE tablety loratadinum**

#### **Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.**

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Claritine musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

#### **V příbalové informaci naleznete:**

1. Co je Claritine a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claritine užívat
3. Jak se Claritine užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Claritine uchovávat
6. Další informace

### **1. CO JE CLARITINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ**

Claritine patří do skupiny látek zvaných antihistaminika. Antihistaminika pomáhají zmírňovat alergické příznaky tím, že zabraňují účinkům látky zvané histamin, která se vytváří v organismu.

Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýčání, rýma, pálení a svědění nosu a očí.

Claritine také pomáhá zmírnit příznaky chronické kopřivky (svědění, zarudnutí a počet a rozsah kopřivkových pupenů), u níž není známa příčina (tzv. chronická idiopatická kopřivka).

Zmírnění těchto příznaků přetrvává celý den a pomáhá Vám obnovit Vaše normální denní aktivity a spánek.

**Bez konzultace s lékařem je použití přípravku možné u projevů akutní alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí starších 12 let.**

### **2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLARITINE UŽÍVAT**

#### **Neužívejte Claritine**

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na loratadin nebo na kteroukoli další složku přípravku Claritine.

### **Zvláštní opatření při použití přípravku Claritine je zapotřebí**

Než začnete přípravek Claritine užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem,

- jestliže trpíte onemocněním jater.

### **Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky**

Vliv přípravku Claritine na efekt alkoholických nápojů nebyl prokázán.

Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jestliže užíváte ještě jiné léky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem o vhodnosti jejich současného užívání s přípravkem Claritine.

### **Užívání přípravku Claritine s jídlem a pitím**

Claritine se může užívat s jídlem nebo bez jídla.

### **Těhotenství a kojení**

Jestliže jste těhotná, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.

Jestliže kojíte, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Při doporučené dávce se neočekává, že by přípravek Claritine způsoboval ospalost nebo menší pozornost.

Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje.

### **Důležitá informace o některých složkách přípravku Claritine**

Claritine, tablety, obsahuje laktosu (mléčný cukr); proto jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte neshášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře před použitím tohoto léčivého přípravku.

### **Laboratorní testy**

Pokud máte naplánované provedení kožních testů na alergii, neměl(a) byste užívat Claritine dva dny před provedením těchto testů, protože tento lék může ovlivnit výsledky testu.

## **3. JAK SE CLARITINE UŽÍVÁ**

Vždy užívejte přípravek Claritine přesně podle pokynů svého lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

### **Dospělí a děti starší 12 let**

Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.

### **Děti ve věku 2 až 12 let**

- s tělesnou hmotností více než 30 kg

Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.

- s tělesnou hmotností 30 kg nebo méně

Tableta o síle 10 mg není vhodná pro děti s tělesnou hmotností menší než 30 kg.

### **Pacienti se závažným poškozením jater**

Dospělí a děti s tělesnou hmotností více než 30 kg

Užívat jednu tabletu každý druhý den, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.

Claritine se nedoporučuje pro děti mladší 2 let.

**Jestliže jste užil(a) více přípravku Claritine, než jste měl(a)**

Užívejte Claritine pouze tak, jak je uvedeno výše. Při náhodném předávkování se neočekávají vážné problémy. Avšak jestliže užijete více přípravku Claritine, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

**Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Claritine**

Jestliže zapomenete dávku užít včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku tak, jak je předepsáno. Nezdvoujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

#### **4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Podobně jako všechny léky, může mít i Claritine nežádoucí účinky. Kontaktujte lékaře nebo lékárníka, jestliže máte jakoukoliv reakci na přípravek Claritine, která trvá, je obtížná nebo si myslíte, že je vážná.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí ve věku 2 až 12 let zahrnují bolest hlavy, nervozitu a únavu. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dospělých a mladistvých zahrnují ospalost, bolest hlavy, zvýšenou chuť k jídlu a potíže se spaním.

Po uvedení přípravku Claritine na trh byly velmi vzácně hlášeny závažné případy alergické reakce, závrať, nepravidelný nebo rychlý tep srdce, nevolnost, sucho v ústech, žaludeční potíže, problémy s játry, vypadávání vlasů, vyrážka a únava.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

#### **5. JAK CLARITINE UCHOVÁVAT**

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru.

Jestliže zjistíte jakoukoliv změnu ve vzhledu tablet, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

#### **6. DALŠÍ INFORMACE**

**Co Claritine obsahuje**

- Léčivou látkou je loratadin 10 mg v jedné tabletě.
- Pomocné látky jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát.

### **Jak Claritine vypadá a co obsahuje toto balení**

Popis přípravku Claritine, tablety: bílé nebo téměř bílé oválné tablety s logem Schering, s půlicí rýhou, označené "10" na jedné straně.

Tablety jsou baleny v blistrech po 7, 10, 30 nebo 60 tabletách v jednom balení.  
Pro balení 7, 10 a 30 tablet je výdej možný bez lékařského předpisu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

#### **Držitel rozhodnutí o registraci**

Merck Sharp & Dohme B.V.  
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem  
Nizozemsko

#### **Výrobce**

Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgie

#### **Datum poslední revize textu**

20.3.2013