

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Nurofen Rapid 200 mg Capsules Měkké tobolky Ibuprofenum

Pro použití u dospělých a dětí vážících více než 20 kg (okolo 6 let věku).

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, pokud máte horečku, a do 4 dnů, pokud lék užíváte k úlevě od bolesti, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules užívat
3. Jak se přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK NUROFEN RAPID 200 MG CAPSULES A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ibuprofen patří do skupiny léčiv nazývaných nesteroidní antirevmatika (NSAIDs). Tato léčiva zmírňují příznaky změnou způsobu, jakým tělo reaguje na bolest, otok a zvýšenou teplotu. Přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules se v těle snadno rozpadá a léčivá látka, která se z tobolky uvolňuje, se snadno vstřebává a rychle dosahuje místa bolesti.

Přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules se používá ke:

- zmírnění příznaků mírné až středně silné bolesti, jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů, menstruační bolesti a
- snížení horečky a zmírnění bolesti při nachlazení.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NUROFEN RAPID 200 MG CAPSULES UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules:

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ibuprofen, látku ponceau 4R (E 124) nebo na kteroukoli jinou složku přípravku Nurofen Rapid 200 mg Capsules;
- jestliže jste měl po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných léků proti bolesti (nesteroidních antirevmatik) dušnost, astma, vodnatou rýmu, otok nebo kopřivku;
- jestliže máte nebo jste prodělal/a dvě nebo více epizod žaludečních vředů nebo krvácení do žaludku;
- jestliže jste měli v minulosti krvácení v trávicí soustavě nebo perforaci související s předchozí léčbou nesteroidními antirevmatiky v anamnéze;

- jestliže máte těžkou chorobu jater, ledvin, ischemickou chorobu srdce nebo srdeční selhání;
- lék nepodávejte dětem vážícím méně než 20 kg;
- jestliže trpíte cerebrovaskulárním nebo jiným aktivním krvácením;
- jestliže trpíte neobjasněnými poruchami krvetvorby;
- jestliže trpíte silnou dehydratací (způsobenou zvracením, průjmem nebo nedostatečným příjmem tekutin);
- během posledních 3 měsíců těhotenství (viz níže).

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Nurofen Rapid 200 mg Capsules je zapotřebí:

- jestliže máte určité choroby kůže (systémový lupus erythematoses (SLE) nebo smíšené choroby pojivových tkání);
- jestliže trpíte závažnými kožními reakcemi, jako je exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza; používání přípravku Nurofen Rapid 200 mg Capsules se musí ukončit ihned při prvním výskytu kožní vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoli jiných projevů alergických reakcí;
- jestliže máte dědičnou poruchu krvetvorby (akutní intermitentní porfyrie);
- jestliže máte nebo jste kdykoli v minulosti měl/a chorobu střev (ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba);
- jestliže jste kdykoli v minulosti měl/a vysoký krevní tlak a/nebo srdeční selhání;
- jestliže máte sníženou funkci ledvin;
- jestliže máte poruchu jater;
- bezprostředně po velké operaci;
- jestliže máte nebo jste měl/a astma nebo alergickou chorobu, protože může dojít k dušnosti;
- jestliže trpíte sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickými obstrukčními respiračními poruchami, protože je zde zvýšené riziko alergických reakcí; tyto alergické reakce se mohou projevovat jako záchvaty astmatu (tzv. analgetické astma), Quinckeho edém nebo kopřivka;
- během planých neštovic (varicella) se doporučuje přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules neužívat;
- léčivé přípravky jako Nurofen Rapid 200 mg Capsules mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika infarktu myokardu nebo mrtvice; jakékoli riziko je pravděpodobnější při vysokých dávkách a dlouhodobé léčbě; nepřekračujte doporučenou dávku nebo dobu trvání léčby (3 dny, jestliže máte horečku, a 4 dny v případě mírnění bolesti);
- jestliže máte problémy se srdcem, měl/a jste mrtvici nebo pokud máte za to, že byste mohl/a být těmito stavy ohrožen/a (například jestliže máte vysoký krevní tlak, cukrovku nebo vysoký cholesterol případně pokud kouříte), musíte léčbu probrat se svým lékařem nebo lékárníkem;
- jestliže trpíte poruchami srážení krve;
- při dlouhodobém podávání přípravku Nurofen Rapid 200 mg Capsules se vyžadují pravidelné kontroly jaterních testů, funkce ledvin a krevního obrazu;
- současné používání s nesteroidními antirevmatiky, včetně specifických inhibitorů cyklooxygenázy 2, zvyšuje riziko nežádoucích účinků (viz bod "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky" uvedený dále) a je nutno mu zamezit.

Nežádoucí účinky se minimalizují užíváním nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu. Starší osoby jsou nežádoucími účinky ohroženy více.

Obecně platí, že habituální užívání (několika druhů) analgetik může vést k těžkým problémům s ledvinami. Toto riziko může být zvýšeno při tělesné námaze spojené se ztrátou solí a dehydratací. Tomu je proto třeba zamezit.

Při dlouhodobém používání léků proti bolesti se mohou vyskytnout bolesti hlavy, které se nesmějí léčit zvýšením dávek léčivého přípravku.

Pokud se Vás týká kterákoli z výše uvedených záležitostí, poraďte se předtím, než začnete přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules užívat, s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Čemu se musíte vyhnout, pokud užíváte další léčivé přípravky?

Některé léky, jako jsou antikoagulanty (působí proti srážení krve) (např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin), některé léky proti vysokému krevnímu tlaku (ACE inhibitory, např. kaptopril, betablokátory,

antagonisté angiotenzinu II) a dokonce i některé jiné léky mohou mít vliv na léčbu ibuprofenem nebo jím mohou být ovlivněny. Proto se předtím, než začnete užívat ibuprofen spolu s dalšími léky, vždy poraďte s lékařem.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zejména je informujte, pokud užíváte:

kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná nesteroidní antirevmatika (léky proti zánětu a bolesti)	jelikož se může zvýšit riziko vředů nebo krvácení v trávicí soustavě
digoxin (lék používan při srdeční nedostatečnosti)	jelikož může být zesílen účinek digoxinu
glukokortikoidy (léčivé přípravky obsahující kortizon nebo jemu podobné látky)	jelikož se může zvyšovat riziko vředů nebo krvácení v trávicí soustavě
protidestičkové léky (lék proti srážení krve)	jelikož se může zvyšovat riziko krvácení
kyselinu acetylsalicylovou (v nízkých dávkách)	jelikož může být narušen účinek ředící krev
léky na ředění krve (jako je warfarin)	jelikož ibuprofen může zesilovat účinky těchto léků
fenytoin (lék proti epilepsii)	jelikož může být zesílen účinek fenytoinu
selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky používané k léčbě depresí)	protože tyto léky mohou zvyšovat riziko krvácení v trávicí soustavě
lithium (lék na maniodepresivní chorobu a deprese)	jelikož může být zesílen účinek lithia
probenecid a sulfínpyrazony (léky proti dně)	jelikož může být prodlouženo vylučování ibuprofenu
léky na vysoký krevní tlak a tablety na odvodnění	jelikož ibuprofen může snižovat účinky těchto léčiv a může zde být případně zvýšeno riziko poškození ledvin
kalium šetřící diuretika	jelikož to může vést k hyperkalémii (zvýšené hladině draslíku v krvi)
methotrexát (lék proti rakovině nebo revmatismu)	jelikož účinek methotrexátu může být zesílen
takrolimus a cyklosporin (imunosupresivní léky)	jelikož může dojít k poškození ledvin
zidovudin (lék k léčbě AIDS)	jelikož užívání přípravku Nurofen Rapid 200 mg Capsules může vést ke zvýšenému riziku krvácení do kloubů nebo ke krvácení, které vede k otokům u hemofiliků pozitivních na HIV
deriváty sulfonylmočoviny (léky na léčbu cukrovky)	mohou být možné interakce
chinolonová antibiotika	jelikož může být zvýšeno riziko vzniku křečí

Užívání přípravku Nurofen Rapid 200 mg Capsules s jídlem a pitím:

Tobolky zapíjejte vodou. Doporučuje se, aby pacienti s tzv.citlivým žaludkem užívali přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules s jídlem. Pokud přípravek užijete krátce po jídle, může být nástup jeho účinku zpožděn. Pokud k tomu dojde, neužívejte více přípravku Nurofen Rapid 200 mg Capsules, než je doporučeno v části "Jak se přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules užívá" uvedené dále nebo dokud neuplyne interval pro další dávku.

Některé nežádoucí účinky, jako jsou nežádoucí účinky postihující gastrointestinální systém, mohou být pravděpodobnější, pokud současně s přípravkem Nurofen Rapid 200 mg Capsules užijete alkohol.

Těhotenství a kojení:

Tento lék neužívejte během posledních 3 měsíců těhotenství. Jeho užívání se vyhněte během prvních 6 měsíců těhotenství, ledaže by Vám lékař doporučil jej užívat.

Tento lék prostupuje do mateřského mléka, ale lze jej během kojení užívat, pokud se užívá v doporučené dávce a po co nejkratší dobu.

Tento léčivý přípravek patří do skupiny léků (nesteroidní antirevmatika), které mohou narušit plodnost žen. Tento účinek po vysazení léku vymizí.

Poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Při krátkodobém užívání a v normálních dávkách nemá žádný nebo má jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nurofen Rapid 200 mg Capsules:

Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na něj předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje barvivo ponceau 4R (E 124). To může způsobovat alergické reakce.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NUROFEN RAPID 200 MG CAPSULES UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý/á, poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, obvyklá dávka přípravku je:

Dospělí a dospívající vážící více než 40 kg:

Úvodní dávka: Užijte 1 nebo 2 tobolky (200 až 400 mg ibuprofenu) a zapijte je vodou. V případě potřeby užijte další dávku 1 až 2 tobolek (200 až 400 mg ibuprofenu), nepřekračujte však celkovou dávku 6 tobolek za 24 hodin. Dávkovací interval nesmí být kratší než 4 hodiny u 200 mg dávky a kratší než 6 hodin u 400 mg dávky.

Děti s tělesnou hmotností od 20 kg (okolo věku 6 let) do 39 kg:

Přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules se smí používat pouze u dětí, které váží alespoň 20 kg. Maximální celková denní dávka ibuprofenu je 20 až 30 mg na kg tělesné hmotnosti, rozdělená do 3 až 4 jednotlivých dávek. Dávkovací interval nesmí být kratší než 6 hodin. Nepřekračujte maximální doporučenou denní dávku. Během 24 hodin nesmí být překročena celková dávka ibuprofenu 30 mg/kg.

Pro přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules u dětí platí následující dávkovací pokyny:

Tělesná hmotnost	Dávka	Jak často?
Děti s tělesnou hmotností 20 až 29 kg	1 tobolka (200 mg ibuprofenu)	Jestliže je to potřebné, užijte další dávku po minimálně 8 hodinách. Během 24 hodin neužívejte více než 3 tobolky (600 mg ibuprofenu).
Děti s tělesnou hmotností 30 až 39 kg	1 tobolka (200 mg ibuprofenu)	Jestliže je to potřebné, užijte další dávku po minimálně 6 až 8 hodinách. Během 24 hodin neužívejte více než 4 tobolky (800 mg ibuprofenu).

Způsob podávání:

Perorální podání. Nežvýkejte.

Pokud máte pocit, že účinek tohoto léku je silnější nebo slabší, než jste čekali/a, obraťte se prosím na svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže potřebuje přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules užívat déle než 3 dny, pokud máte horečku, nebo déle než 4 dny, pokud jej užíváte k úlevě od bolesti, nebo pokud se příznaky zhorší, obraťte se na svého lékaře.

Jestliže jste užil/a více přípravku Nurofen Rapid 200 mg Capsules, než jste měl/a:

Ihned se obraťte na lékaře. Mohou se vyskytnout následující příznaky: nauzea, zvracení, bolesti žaludku, bolesti hlavy, točení hlavy a malátnost. Vzácně: nízký krevní tlak a ztráta vědomí (myoklonické křeče u dětí), utlumené dýchání (deprese dechu) a modré zbarvení kůže a sliznic (cyanóza).

Jestliže máte jakékoli další otázky o používání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky lze minimalizovat užíváním co nejnižší dávky po co nejkratší dobu nezbytnou k úlevě od příznaků. I když jsou nežádoucí účinky méně časté, můžete jedním ze známých účinků nesteroidních antirevmatik být postižen/a. Pokud se tak stane nebo pokud se toho obáváte, přestaňte tento lék užívat a co nejdříve se obraťte na svého lékaře. Starší lidé užívající tento přípravek jsou vznikem problémů souvisejících s nežádoucími účinky ohroženi více.

Jako základ při hodnocení nežádoucích účinků jsou vzaty následující četnosti:

Velmi časté	postihují více než 1 uživatele z 10
Časté	postihují 1 až 10 uživatelů ze 100
Méně časté	postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000
Vzácné	postihují 1 až 10 uživatelů ze 10 000
Velmi vzácné	postihují méně než 1 uživatele z 10 000
Není známo	četnost nelze z dostupných údajů určit

Nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

Infekce:

Velmi vzácné: Výjimečně kožní infekce při planých neštovicích. Byla popsána vzplanutí zánětů souvisejících s infekcí (např. nekrotizující fascitida) spojená s užíváním některých léků proti bolesti (nesteroidních antirevmatik).

Pokud se během užívání přípravku Nurofen Rapid 200 mg Capsules objeví příznaky infekce nebo pokud se zhorší, musíte bezodkladně navštívit lékaře. Je nutno vyšetřit, zda není potřeba předepsat protiinfekční / antibiotickou léčbu. Při užívání ibuprofenu byly pozorovány příznaky aseptické meningitidy se ztuhnutím šíje, bolestmi hlavy, nevolností, zvracením, horečkou nebo zastřeným vědomím. Zdá se, že pacienti s autoimunitními chorobami (systémový lupus erytematodes, smíšené choroby pojivové tkáně) jsou k tomuto nežádoucímu účinku predisponováni.

Krevní poruchy:

Velmi vzácné: Problémy s tvorbou krvinek; prvními příznaky jsou: horečka, bolesti v krku, povrchové vředy v ústech, příznaky podobné chřipce, těžké vyčerpání, krvácení z nosu a do kůže. V těchto případech musíte léčbu ihned přerušit a obrátit se na lékaře. Nesmí se provádět žádná samoléčba přípravky proti bolesti nebo léčivými přípravky, které snižují horečku (antipyretika).

Problémy imunitního systému:

Méně časté: Alergické reakce s kopřivkou a svěděním, stejně jako astmatické záchvaty. Musíte přestat přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules užívat a musíte ihned informovat svého lékaře.

Velmi vzácné: Těžké hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivlosti); příznaky mohou být: otok obličeje, jazyka a hrdla, dušnost, zrychlený tep, nízký krevní tlak, těžký šok. Pokud se jeden z těchto příznaků vyskytne, k čemuž může dojít už při prvním užití, je třeba okamžitá lékařská pomoc.

Psychiatrické poruchy:

Velmi vzácné: Psychotické reakce, deprese.

Poruchy nervového systému:

Méně časté: Bolesti hlavy, točení hlavy, nespavost, agitovanost, podrážděnost a únava.

Poruchy oka:

Méně časté: Poruchy vidění.

Poruchy ucha a labyrintu:

Vzácné: Zvonění v uších.

Srdeční poruchy:

Velmi vzácné: V souvislosti s léčbou nesteroidními antirevmatiky ve vysokých dávkách bylo hlášeno bušení srdce, srdeční selhání, infarkt myokardu, otok, hypertenze a selhání srdce.

Cévní poruchy:

Velmi vzácné: Arteriální hypertenze.

Poruchy žaludku a střev:

Časté: Žaludeční obtíže, jako je pálení žáhy, bolesti žaludku a nevolnost, průjem, zvracení, plynatost, zácpa, slabé krvácení v žaludku a/nebo střevech, které může ve výjimečných případech způsobit chudokrevnost (anemii).

Méně časté: Proděravění trávicího traktu nebo krvácení do trávicího traktu, černá stolice a zvracení krve, zhoršení stávající choroby střev (ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby), gastritida.

Velmi vzácné: Zánět jícnu, zánět slinivky břišní, tvorba membránovitých srůstů.

V případě silné bolesti v horní části břicha, zvracení krve nebo černé stolice musíte léčbu ukončit a obrátit se na lékaře.

Poruchy jater:

Velmi vzácné: Poškození jater (prvními příznaky může být změna barvy kůže) zvláště při dlouhodobé léčbě, selhání jater, akutní zánět jater.

Poruchy kůže:

Velmi vzácné: Těžké formy kožních reakcí včetně vyrážky se zarudnutím a tvorbou puchýřů, Stevens-Johnsonův syndrom a odumírání tkáně.

Poruchy ledvin:

Vzácné: Léky jako přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules mohou velmi vzácně vést k poškození ledvin. Bolest v boku a/nebo břicho, krev v moči a horečka mohou být projevy poškození ledvin (papilární nekrózy). Rovněž se vzácně mohou vyskytnout zvýšené hladiny močoviny v krvi.

Velmi vzácné: Menší výdej moči než je obvyklé a otoky (zvláště u pacientů s vysokým krevním tlakem nebo oslabenou funkcí ledvin); otok (edém) a zakalená moč (nefrotický syndrom), zánětlivé onemocnění ledvin (intersticiální nefritida), které může vést k akutnímu selhání ledvin. Pokud se vyskytne jeden z výše uvedených příznaků nebo pokud se celkově necítíte dobře, přestaňte přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules užívat a poraďte se ihned se svým lékařem, protože může jít o první příznaky poškození ledvin nebo selhání ledvin.

Léky, jako je přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules, mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika infarktu myokardu nebo mrtvice.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NUROFEN RAPID 200 MG CAPSULES UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Chraňte před chladem nebo mrazem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules obsahuje:

Léčivou látkou je ibuprofenum.

Jedna tobolka obsahuje 200 mg ibuprofenum.

Pomocnými látkami jsou:

Obsah tobolky:

Makrogol 600

Hydroxid draselný (minimálně 85% čistota)

Čištěná voda

Obal tobolky:

Dehydratovaný sorbitol (E 420)

Želatina

Ponceau 4R (E 124)

Inkoust:

Opacode WB bílý NS-78-18011 (sestavující z oxidu titaničitého (E 171), propylenglykolu, hypromelosity (E 464))

Jak přípravek Nurofen Rapid 200 mg Capsules vypadá a co obsahuje toto balení:

Měkké tobolky jsou červené, oválné, průsvitné s identifikačním potiskem.

Tobolky jsou k dispozici v baleních po 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 40 nebo 50 měkkých tobolkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Slough

Velká Británie

Výrobce:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottigham
Velká Británie

SIA ELVIM (pro Litvu, Lotyšsko, Estonsko)
Kurzemes prospekts 3-513
Riga
LV-1067
Lotyšsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o.
Atrium Flora, Budova C
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Česká republika
Tel.: +421 227 110 141

Tento léčivý přípravek byl registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Rakousko	Nurofen Rapid 200 mg Weichkapseln
Bulharsko	Nurofen Express 200 mg Soft Capsules
Kypr	Nurofen 200 mg Liquid Capsules
Česká republika	Nurofen Rapid 200 mg Capsules
Estonsko	Nurofen Ultra Express 200 mg pehmekapslid
Finsko	Nuroflash
Francie	NUROFLASH 200 mg capsule molle
Německo	Nurofen Immedia 200 mg Weichkapseln
Řecko	Nurofen 200 mg Μαλακες κάψουλες
Maďarsko	Nurofen Rapid 200 mg lágy kapszula
Island	Nurofen Express
Lotyšsko	Nurofen Ultra Express 200 mg mīkstās kapsulas
Litva	Nurofen Ultra Express 200 mg minkštos kapsulės
Malta	Nurofen Express 200 mg capsules
Nizozemsko	Nurofen Zavance Lea 200 mg liquid capsules
Polsko	Nurofen Express Femina
Rumunsko	NUROFEN EXPRESS 200 mg capsule moi
Slovenská republika	Nurofen Rapid 200 mg Capsules
Slovinsko	Nurofen Immedia 200 mg mehke kapsule

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 13.2.2013