

***Příbalová informace: Informace pro uživatele***

**CORSODYL**

Ústní voda

Chlorhexidini digluconas

**Držitel rozhodnutí o registraci:**

**GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford TW8 9GS, Velká Británie**

**Výrobce:**

**GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Herrenberg, Německo**

**Složení:**

**Léčivá látka** - Chlorhexidini digluconas 0,2 g, odpovídá Chlohexidini digluconatis solutio 1 ml ve 100 ml.

**Pomocné látky** – ethanol 95%, hydrogenicinomakrogol, silice máty peprné, nekrytalizující sorbitol 70%, čištěná voda.

**Indikační skupina:** stomatologikum, antiseptikum, dezinficiens

**Charakteristika:** Ústní voda Corsodyl je antibakteriální roztok, který zastavuje tvorbu zubního plaku. Léčivá látka chlorhexidin působí proti široké škále bakterií, proti kvasinkám, některým plísním a virům, které způsobují infekční onemocnění a záněty v dutině ústní.

**Indikace:** Corsodyl ústní voda se používá v těchto případech:

- \* k léčbě a prevenci zánětu dásní
- \* k udržování hygieny dutiny ústní v situacích, kdy není možné důkladné čištění zubů kartáčkem
- \* k podpoře hojení dásní po chirurgických zákrocích v dutině ústní
- \* k léčbě opakujících se vřidků (aftů) v dutině ústní
- \* u zánětu dásní způsobeného zubní protézou
- \* u plísňových onemocnění dutiny ústní (soor)

Corsodyl ústní voda je určena pro dospělé, mladistvé a děti.

**Kontraindikace:** Corsodyl ústní voda se nesmí používat při známé přecitlivělosti na chlorhexidin glukonát (léčivá látka přípravku) nebo kteroukoliv jinou složku přípravku.

Nesmí se používat k vytírání dutiny ústní v kojeneckém věku. Ústní vodu nesmí používat děti, které nezvládnou ústa pouze vyplachovat a roztok nepolykat!

**Nežádoucí účinky:** Může se objevit zbarvení jazyka, které vymizí po skončení léčby.

Rovněž se může objevit zbarvení zubů, korunek a zubních protéz. Zbarvení není trvalé, může se mu zabránit důkladným čištěním zubů kartáčkem a zubní pastou dvakrát denně s důkladným vyláchnutím úst vodou **před** použitím ústní vody Corsodyl. Pro zubní protézy by měl být rovněž používán běžný čistící prostředek. V některých případech je třeba, aby úplné odstranění zbarvení provedl stomatolog. Jestliže máte bílé zubní výplně, poraďte se nejdříve se svým zubním lékařem o používání této ústní vody. V některých případech bude po skončení léčby ústní vodou pravděpodobně nutné očistit chrup v zubní ordinaci.

Na začátku léčby se mohou objevit přechodně změny chuti a mírné pálení jazyka. Tyto projevy obvykle vymizí po přerušení léčby. Někdy může dojít k olupování sliznice jazyka.

Naředění ústní vody stejným dílem vody umožní pokračovat v léčbě (vždy naředit až před použitím). Velmi zřídka se může objevit zduření slinných žláz nebo alergická reakce (např. kožní

vyrážka). V tomto případě přerušete používání přípravku a poradte se o dalším používání ústní vody se zubním lékařem.

**Interakce:** Informujte, prosím, svého lékaře, zubního lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Závažné reakce ústní vody Corsodyl s jinými léky nejsou známy.

**Dávkování a způsob použití:** Dvakrát denně vyplachujte ústa 10 ml ústní vody ( k rýsce uvnitř uzávěru) po dobu asi 1 minuty. Před stomatologickým chirurgickým zákrokem si vyplachujte ústa dle rady lékaře.

Čistíte-li si zuby normálně pomocí zubní pasty, používejte zubní pastu **před** použitím ústní vody Corsodyl (ústa pak důkladně vypláchněte) nebo v různou dobu během dne.

Pokud lékař neurčí jinak, trvá obvykle léčba zánětu dásní (gingivitis) asi 1 měsíc.

Léčba aftů v dutině ústní, zánětu dásní způsobeného zubní protézou a plísňových infekcí má pokračovat ještě 2 dny po vymizení příznaků onemocnění, nejdéle však 1 měsíc.

Při léčbě zánětu dutiny ústní způsobeného zubní protézou je nutné zubní protézu důkladně čistit a namáčet v ústní vodě Corsodyl dvakrát denně po dobu 15 minut.

V případě, že se příznaky onemocnění zhoršují nebo přetrvávají po uplynutí doporučené délky léčby, je třeba používání roztoku přerušit a poradit se se zubním lékařem.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

#### **Upozornění:**

Jste-li těhotná nebo kojíte, poradte se se svým zubním lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. V době těhotenství a při kojení je možno používat ústní vodu Corsodyl.

Přípravek používejte pouze jako ústní vodu, roztok nepolykejte.

Při náhodném spolknutí jsou nežádoucí účinky nepravděpodobné.

V případě, že došlo ke spolknutí většího množství než je 10 ml, je vhodné se poradit se zubním lékařem nebo lékárníkem.

Chraňte oči a uši před stykem s přípravkem. Pokud přípravek přijde do očí, je třeba oči rychle a důkladně vypláchnout vodou.

Dejte pozor, aby nedošlo k potřísnění oděvu, protože může dojít ke zbarvení.

**Uchovávání:** Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C.

#### **Varování:**

Přípravek se nesmí používat po uplynutí data použitelnosti vyznačeném na obalu.

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

**Balení:** 300 ml

**Datum poslední revize:** 7.5.2012