

sp.zn. sukls96055/2013

Příbalová informace

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Multi – Sanostol

sirup

Držitel rozhodnutí o registraci

Takeda GmbH
78467 Konstanz
Německo

Výrobce

Takeda Pharma Sp.Z o.o.
99-420 Lyszkowice
Polsko

Složení

10 ml sirupu obsahuje

Léčivé látky

Retinoli palmitas (vitamín A)	1,3 mg (2400 m.j.)
Colecalciferolum (vitamín D ₃)	0,005 mg (200 m.j.)
Thiamini hydrochloridum (vitamín B ₁)	2 mg
Riboflavini natrii phosphas (vitamín B ₂)	2 mg
Pyridoxini hydrochloridum (vitamín B ₆)	1 mg
Acidum ascorbicum (vitamín C)	100 mg
Tocoferoli alfa acetat (vitamín E)	2 mg
Nicotinamidum (vitamín B ₃)	10 mg
Dexpanthenolum (Dexpanthenol)	4 mg
Calcii gluconas (monohydrát glukonanu vápenatého)	50 mg
Calcii lactophosphas (kalcium-laktofosfát)	50 mg

Pomocné látky

Sacharosa, tekutá glukosa, kyselina citronová, agar, tragant, hustý sladový extrakt, natrium-benzoát, tetrahydrát kalcium-sacharátu, polysorbát 80, silice oplodí sladkého pomeranče, grapefruitové aroma, sušená pomerančová šťáva, kyselina sorbová, čištěná voda.

Indikační skupina

Multivitaminový přípravek.

Charakteristika

Multivitaminový přípravek pro děti obsahující 9 důležitých vitamínů a vápník.

Indikace

Přípravek se používá jako prevence nedostatku vitamínů (u dětí od 1 roku), v těhotenství, v době kojení, při ztrátě chuti k jídlu, vnímavosti vůči infekcím, při poruchách vývoje a růstu, při stavech vyčerpanosti, oslabeného soustředění a školní únavy, ke zlepšení celkového stavu po prodělané nemoci.

Přípravek mohou užívat děti od 1 roku, mladiství a dospělí.

Kontraindikace

Multi-Sanostol se nesmí užívat při přecitlivělosti na některou složku přípravku, při hypercalcemii (zvýšený obsah kalcia v krvi) a hypercalciurii (zvýšené vylučování kalcia v moči), při hypervitaminóze A a D.

Nežádoucí účinky

Nejsou žádné.

Interakce

Nejsou známy v rozsahu doporučených dávek.

Dávkování a způsob použití

Děti od 1 do 5 let užívají denně 10 ml ve dvou jednotlivých dávkách (1 kávová lžička odpovídá zhruba 5ml), děti od 6 let a dospělí 20ml ve dvou jednotlivých dávkách (1 dětská lžička odpovídá zhruba 10ml). Tato dávka se nesmí překročit! U těhotných žen nepřekračovat dávku 20ml/den!

Délka používání

Multi-Sanostol je možno užívat po dobu 3 měsíců. Při delším používání se poraďte s lékařem.

Upozornění

Užíváte-li jiné léky (na lékařský předpis i bez něj) poraďte se o vhodnosti užívání přípravku Multi-Sanostol s lékařem.

Při delším podávání než 3 měsíce, nebo při použití vyšších než dvojnásobných dávek se poraďte s lékařem. Při překročení doporučeného dávkování, a zejména při současném užívání jiných přípravků obsahujících vitamín A a vitamín D, existuje možnost předávkování vitamíny A a D.

Pro diabetiky: 10ml Multi-Sanostolu obsahuje zhruba 8g stravitelných sacharidů.

Příležitostné žluté zbarvení moči po užití Multi-Sanostolu je způsobeno obsahem vitamínu B₂ a je tudíž zcela neškodné.

O vhodnosti současného užívání jiných volně prodejných léků se poraďte s lékařem. Při předpisu jiných léků oznamte lékaři, že užíváte Multi-Sanostol.

Bez porady s lékařem neužívejte současně další přípravky s obsahem vitamínů nebo minerálů.

Při požití většího množství přípravku zvláště dětmi se poraďte s lékařem.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Po otevření lahvičky je doba použitelnosti přípravku 12 týdnů.

Varování

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Balení

300, 600, g sirupu.

Datum poslední revize:

30.5.2013