

PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Projímavá čajová směs

Léčivý čaj

SLOŽENÍ

Sennae folium (sennový list) 750 mg, *Menthae piperitae herba* (nať máty peprné) 300 mg, *Foeniculi fructus* (fenyklový plod) 150 mg, *Liquiritiae radix* (lékořicový kořen) 150 mg, *Millefolii herba* (řebříčková nať) 150 mg v 1 nálevovém sáčku.

POUŽITÍ

Rostlinný léčivý přípravek určený pro krátkodobou léčbu funkční zácpy provázenou nadýmáním.

Přípravek má mírné protizánětlivé účinky.

PŘÍPRAVA

1 nálevový sáček se přelije ¼ l vroucí vody, nechá se 10 - 15 min vyluhovat. Nesmí se vařit. Čaj se pije vlažný, neslazený, 1 x denně nejlépe na noc. Většinou postačí podávat léčivo dvakrát až třikrát týdně.

Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím. Účinek nastává za 8 až 12 hodin.

KONTRAINDIKACE

Známá přecitlivělost na léčivou látku.

Neprůchodnost a/nebo ochablost střev, průjemová onemocnění, náhlé příhody břišní, zánět slepého střeva, zánětlivá onemocnění střev (např. Crohnova choroba, ulcerózní kolitida – zánět tlustého střeva doprovázený tvorbou vředů), bolesti břicha neznámého původu, ztráty tekutin a úbytek elektrolytů.

Děti do 12 let, těhotné ženy a kojící matky.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jen velmi zřídka může přípravek vyvolat kožní reakce (svědění, kopřivka, zarudnutí pokožky).

Přípravek může vyvolat křečovitě bolesti břicha a vodnatou stolicí, zejména u pacientů s dráždivým tračníkem. Tyto příznaky se však také projevují při předávkování. V těchto případech je nutné snížit dávku.

Při dlouhodobém užívání (nebo předávkování) se objevují průjmy, které vedou k nadměrné ztrátě vody a minerálů (zejména draslíku), což může způsobit např. oběhové nebo srdeční poruchy.

Chronické užívání vysokých dávek může vyvolat toxický zánět jater.

INTERAKCE

Dlouhodobé užívání přípravku snižuje hladinu draslíku v krvi, což může zvyšovat účinek srdečních glykosidů a ovlivňovat účinek léků proti poruchám srdečního rytmu, přípravků vyvolávajících reverzi sinusového rytmu (např. chinidin) a přípravků prodlužujících QT-interval.

Při současném užívání kortikoidů a diuretik a lékořice se může zvýšit tato nerovnováha elektrolytů. Případný negativní vliv lékořice obsažené v přípravku lze potlačit zvýšeným příjmem draslíku. Současné podávání *Sennae folium* s těmito přípravky by mělo být předem konzultováno s lékařem.

UPOZORNĚNÍ

Přípravek je určen pouze ke krátkodobému užívání, po dobu nejdéle jednoho až dvou týdnů. Chronické užívání stále se zvyšujících dávek, může vést k závislosti (návykový syndrom), která může způsobit nerovnováhu hladiny tekutin a elektrolytů.

U pacientů s chorobami ledvin může podávání přípravku způsobit nerovnováhu hladiny elektrolytů, užívání čaje proto konzultujte s lékařem.

Pokud užíváte srdeční glykosidy (digoxin), antiarytmika (léky proti poruchám srdečního rytmu; např. amiodaron, verapamil apod.), diuretika (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči) nebo adrenokortikoidy, poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat Projímavou čajovou směs.

Jestliže trpíte chronickou zácpou nebo jinými nediagnostikovanými zažívacími obtížemi (např. bolesti břicha, nevolnost, zvracení), poraďte se s lékařem, neboť tyto příznaky mohou být známkou závažných zdravotních potíží (neprůchodnosti střev).

Přípravek je vhodné užívat, pouze pokud není možné dosáhnout zlepšení obtíží změnou životního stylu (změna potravních návyků, tzn. příjem většího množství vlákniny a tekutin; zvýšení tělesného pohybu).

Pacientům trpících inkontinencí (neschopnost udržet stolici), je nutné častěji vyměňovat hygienické vložky, aby nedocházelo k nadměrnému kontaktu pokožky se stolicí.

V průběhu užívání přípravku může dojít ke změně barvy moči (žluté nebo červenohnědé zbarvení, závislé na hodnotě pH), které však není klinicky významné a spontánně odezní.

Dlouhodobé podávání může vyvolat pigmentaci (zbarvení) střevní sliznice (pseudomelanosis coli), která obvykle ustupuje po vysazení přípravku.

Při výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí přestaňte přípravek užívat a vyhledejte lékaře.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

VELIKOST BALENÍ

30 g, 20 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem i bez přebalu
22,5 g, 15 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem
15 g, 10 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

PN 71 – 02 *nálevové sáčky bez přebalu*

PN 211 - 02 *nálevové sáčky s přebalem*

PN 339 - 07 *nálevové sáčky s přebalem*

PN 348 - 07 *nálevové sáčky s přebalem*

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/855/97-C

EAN KÓD

8 594 0030 72 079 *(nálevový sáček bez přebalu)*
8 595 1519 45 406 *(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)*
8 595 1519 45 581 *(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)*
8 595 1519 45 765 *(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)*

ČÍSLO ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s. r. o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Projímavá čajová směs

DATUM REVIZE TEXTU

19.6.2013