

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Gaviscon sáčky perorální suspenze

(Natrii alginas, natrii hydrogenocarbonas, calcii carbonas)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Gaviscon sáčky musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Gaviscon sáčky a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gaviscon sáčky užívat
3. Jak se přípravek Gaviscon sáčky užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Gaviscon sáčky uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK GAVISCON SÁČKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Gaviscon sáčky patří do skupiny léčiv nazývaných „léky tlumící reflux“ a vytváří ochrannou vrstvu na obsahu žaludku, čímž brání úniku žaludeční kyseliny z žaludku do jícnu a bolesti a nepříjemným pocitům, které žaludeční kyselina v jícnu působí.

Přípravek Gaviscon sáčky se používá k léčbě příznaků gastroezofageálního refluxu jako jsou regurgitace (únik žaludeční kyseliny ze žaludku zpět do jícnu), pálení žáhy a poruchy trávení (spojené s refluxem), například po jídle nebo během těhotenství, případně u nemocných s příznaky spojenými s refluxním zánětem jícnu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK GAVISCON SÁČKY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Gaviscon sáčky

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoli další složku přípravku Gaviscon sáčky, protože se velmi vzácně vyskytla vyrážka nebo potíže s dechem (viz podrobnější informace dále).

Zvláštní opatření při použití přípravku Gaviscon sáčky je zapotřebí

Tento přípravek obsahuje malé množství sodíku (6,2 mmol/ 10 ml) a vápníku (1,6 mmol/ 10 ml).

- Pokud Vám byla doporučena dieta s jejich výrazným omezením, poraďte se se svým lékařem.
- Poraďte se také, prosím, se svým lékařem, pokud trpíte závažným onemocněním ledvin nebo srdce, protože některé soli mohou tyto choroby ovlivňovat.

Pokud víte, že máte sníženou hladinu žaludeční kyseliny, poraďte se, prosím, se svým lékařem, protože účinnost přípravku může být snížena.

Pokud příznaky přetrvávají déle než 7 dní, poraďte se s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Neužívejte tento přípravek, pokud jste v předchozích 2 hodinách užil(a) jiný lék, který se podává ústy, protože přípravek Gaviscon sáčky může ovlivnit účinek jiných léků.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Tento přípravek lze užívat v těhotenství i během kojení.

Důležité informace o některých složkách přípravku Gaviscon sáčky

Přípravek obsahuje methylparaben (E218) a propylparaben (E216), které mohou způsobovat alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK GAVISCON SÁČKY UŽÍVÁ

Perorální podání

Dospělí, včetně starších lidí, a děti od 12 let: 1 až 2 sáčky po jídle a před spaním, nebo jak je určeno lékařem (nejvýše 4krát denně).

Děti mladší 12 let: podávat pouze po konzultaci s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gaviscon sáčky, než jste měl(a)

Pokud užijete příliš velké množství přípravku, pravděpodobně Vám neuškodí. Můžete ale trpět nadýmáním. Pokud se tyto potíže samy neupraví, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gaviscon sáčky

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v dávkování jako předtím.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Gaviscon sáčky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat tento přípravek a neprodleně informujte svého lékaře, pokud se u vás projeví následující nežádoucí účinky. Velmi vzácně (méně než 1 případ z 10 000) se může vyskytnout alergická reakce na složky přípravku. Mezi příznaky této reakce mohou patřit: vyrážka, svědění, potíže s dechem, závratě, nebo otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK GAVISCON SÁČKY UCHOVÁVAT

Přípravek Gaviscon sáčky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na sáčku a krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v originálním obalu.

Chraňte před chladem a mrazem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Gaviscon sáčky obsahuje

Jeden sáček (10 ml) obsahuje léčivé látky : natrii alginas 500 mg, natrii hydrogenocarbonas 267 mg a calcii carbonas 160 mg.

Pomocnými látkami jsou karbomer 974 P, methylparaben (E218), propylparaben (E216), sodná sůl sacharinu, složené mentholové aroma, hydroxid sodný a čištěná voda.

Jak přípravek Gaviscon sáčky vypadá a co obsahuje toto balení

Léčivý přípravek Gaviscon sáčky je téměř bílá suspenze s pepermintovou vůní a příchutí.

Přípravek Gaviscon sáčky je dostupný ve velikostech balení: 2, 4 , 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 a 36 sáčků po 10 ml suspenze.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS
Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko: ГАВИСКОН ЛИКВИД САШЕТА

Česká republika: Gaviscon sáčky

Dánsko: Galieve Cool Mint

Maďarsko: Gaviscon borsmenta ízű belsőleges szuszpenzió tasakban

Slovenská republika: Gaviscon vrecká

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.7.2010

Podrobné informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.

Vinohradská 2828/151

130 00 Praha 3

+420 227 110 111