

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

ALUMINII ACETOTARTRATIS CREMOR HBF

Krém

Aluminii acetotartratis solutio

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Aluminii acetotartratis cremor a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aluminii acetotartratis cremor užívat
3. Jak se Aluminii acetotartratis cremor používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Aluminii acetotartratis cremor uchovávat
6. Další informace

1. CO JE ALUMINII ACETOTARTRATIS CREMOR K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Krém určen pro zevní použití. Působí adstringentně (účinek stahující, svíravý), lehce chladivě, staví kapilární krvácení, tlumí exsudaci (pocení). Rovněž působí antipruriginózně (protisvědívě) a má mírné antiseptické účinky (ničící choroboplodné zárodky).

Krém se používá při léčbě drobného poškození kůže, dále jako prevence otoků při bodnutí hmyzem, kde se současně uplatňuje účinek protisvědívý. Při zánětech kůže, při ozáření a popáleninách. Přípravek lze používat též na omrzliny a po poradě s lékařem při léčbě hemeroidů. Jako prevence a léčba opruzenin a proleženin. Dále pak při lehkých zhmožděních měkkých tkání.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ALUMINII ACETOTARTRATIS CREMOR POUŽÍVAT

Vždy dodržuje pokyny Vašeho lékaře nebo lékárníka, i když se liší od informací uvedených v této příbalové informaci.

Nepoužívejte Aluminii acetotartratis cremor:

- Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na účinnou látku Aluminii acetotartratis solutio nebo některou pomocnou látku obsaženou v přípravku. (viz odstavec **Co přípravek Aluminii acetotartratis cremor obsahuje**).
- Aluminii acetotartratis cremor HBF se nesmí používat při přecitlivělosti na lanolin

(tuk z ovčí vlny).

- Na otevřené nebo krvácející rány, infekční nebo druhotně infikované kožní onemocnění a hnisavá onemocnění kůže.
- Nepoužívejte krém bez rady s lékařem, vyžaduje-li charakter kožního onemocnění dlouhodobější aplikaci krému na rozsáhlejší plochy pokožky, stejně tak při léčbě hemeroidů.
- Krém se nesmí používat na sliznice a do očí.

Přípravek je všeobecně velmi dobře snášen. Výjimečně se může vyskytnout alergie na některou složku krému projevující se výrazným zčervenáním kůže, pocity pálení nebo svědění, někdy i výsevy drobných pupínků nebo puchýřků.

Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem. Při dlouhodobém používání přípravku na rozsáhlé plochy, obzvláště u malých dětí, nelze vyloučit riziko perkutánní resorbce (vstřebávání přes kůži) zdraví škodlivého hliníku.

Aluminií acetotartratis cremor a starší lidé

Starší osoby mohou být citlivější na účinky přípravku Aluminií acetotartratis cremor, než jiní dospělí. Z toho důvodu by měli velmi pečlivě dodržovat pokyny pro užití krému.

Aluminií acetotartratis cremor a děti/mladiství

Přípravek Aluminií acetotartratis cremor mohou používat dospělí, mladiství i děti (u dětí do 2 let po poradě s lékařem).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinná látka přípravku se nesnáší s kožními přípravky obsahujícími tanin, soli stříbra (nejčastěji argentum nitricum), acriflavinum chloratum, aethacridinum lacticum.

Bez rady s lékařem není vhodné nanášet na postižené místo Aluminií acetotartratis cremor HBF současně s jinými kožními přípravky.

Před případným použitím jiných přípravků na kůži je nutné místa ošetřená Aluminií acetotartratis cremor HBF pečlivě omýt vzhledem ke vznikající krustě, která může zabránit pronikání jiných místně aplikovaných léčivých přípravků, zejména mastí s obsahem tetracyklinu.

Těhotenství a kojení

Krém je v léčbě používán mnoho desetiletí, za uvedenou dobu nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky na průběh těhotenství nebo na zdraví plodu či novorozence.

Přípravek mohou používat těhotné a kojící ženy, během kojení je třeba se vyvarovat jeho použití na tlumení projevů zánětu bradavek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů není použitím Aluminií acetotartratis cremor HBF ovlivněna.

3. JAK SE ALUMINIÍ ACETOTARTRATIS CREMOR POUŽÍVÁ

Pokud lékař nedoporučí jinak, krém se nanáší u dospělých i dětí 1 - 3krát denně na postižená místa rovnoměrně v tenké vrstvě, bez obvazu.

V místech, kde by mohlo docházet k opruzeninám, lze vkládat úzký proužek suché hydrofilní gázy.

Délka léčby je individuální v závislosti na charakteru kožního onemocnění.

Při ošetřování drobného poškození kůže lze krém při úspěšnosti léčby používat 1 týden.

Jestliže nedojde k ústupu Vašich obtíží do 3 dnů nebo naopak dojde ke zhoršení, či se projeví nežádoucí účinky léku, přerušete léčbu a poraďte se s lékařem. Vyžaduje-li charakter kožního onemocnění dlouhodobější nanášení přípravku, zvláště na rozsáhlejší plochy pokožky a při léčbě hemeroidů, obraťte se na svého lékaře.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 1 týden.

O vhodnosti současného používání Aluminii acetotartratis cremor HBF s jinými místně působícími léky se poraďte s lékařem.

Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře!

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek je všeobecně velmi dobře snášen. Výjimečně se může vyskytnout přecitlivělost na účinnou látku (hlinité soli) nebo na některou pomocnou složku krému (např. tuk z ovčí vlny – lanolin) projevující se výrazným zčervenáním kůže, pocity pálení nebo svědění, někdy i výsevy drobných pupínek nebo puchýřků.

Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

Při dlouhodobém používání přípravku na rozsáhlé plochy, obzvláště u malých dětí, nelze vyloučit riziko perkutánní resorbce (vstřebávání přes kůži) zdraví škodlivého hliníku.

Oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou vyjmenovány v této informaci.

5. JAK ALUMINII ACETOTARTRATIS CREMOR UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C . Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Aluminii acetotartratis cremor HBF obsahuje

Léčivá látka obsažená v přípravku Aluminii acetotartratis cremor HBF se nazývá Aluminii acetotartratis solutio (roztok hlinitých solí) 10 g / 100 g krému.

Krémový základ: tuk z ovčí vlny (lanolin), žlutá vazelína, čištěná voda

Jak přípravek Aluminii acetotartratis cremor vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: Nažloutlý krém slabě zapáchající po kyselině octové

Balení: Laminátová tuba s Al folií: 100 g krému

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek musí být uchován mimo dosah a dohled dětí.

Držitel rozhodnutí o registraci/ výrobce

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, Pardubice, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 21.4.2010